

1638

An alvi laxitas in herniosis Ileum præcavet?

[illegible]

aponevroses efficiunt, transit, Non vetò intra illam, fieri consentaneum est: quodque certitudinem dictorum au-



In inguine frequentior esse consuevit partium prolapsus, tum quia declivem sternunt viam spermatica vasa, tum quia diductæ fibræ, in imâ transversâ & obliquorum muscularum parte, aperturas relinquunt; quæ licet diffusæ, pro suis varietatibus, aliquando juxta positæ, quasi in unum breve coeunt iter: annulorum nomen immerito obtinet, nisi forte quod obliquus externus aliquid simile repræsentet: nam fibrarum tendinosarum hujus musculi divulsio per longitudinem, fissuræ in modum, sic se habet: in inferiori parte fibræ sese decussant, & ab aliquot alii tendinosi fibræ muscularum femoris, versus hanc partem originem ducentium, pariter decussantur sed superius & inferius ubique certo modo intertexæ & exortæ, multorum oculis annuli formam exhibent. Non ideo tamen ita frequenter adhuc accideret hernia, nisi alia concurrebant: adeit sæpius partium certa dispositio, quæ illius generationem juvat; humiditas, laxitas membranarum, pinguedinis copia, pondere suo partes deorsum trahens, vel quid simile, in Exomphalo exempli causâ nodus, vel funiculi umbilicalis ligatura laxior quavis de causâ, viam præbet: partes enim flexiles & naturâ suâ lubricæ ac impulsæ, facile irruunt & illam subintrant. At in pueris prævia & observatio digna sæpius, reperitur partium bubonocœlem adjuvans dispositio: peritonei processûs dixerit, quos negat Blancardus, herniaque curatæ reliquias censet; sed ab aliis pro naturali habetur, dispositione: ubi scilicet spermatica vasa exteriori peritonei membrânâ circumscripta, ab obliqui externi annulo, ad testes feruntur, in infantibus ductus occurrit cæcus, calami scriptorii crassitie, pollicis longitudine, insitit ductuum illorum quos nonnulli observarunt Anatomici, & sub cæcorum nomine describitur. Notat Hippocrates hyeme præsertim pueros herniosis fieri; nullâ aliâ profectò de causâ, quam quod ut idem pronuntiavit, tum ventres sunt calidiores: facies hic calor insipida, exsiccata, duratque reddit: unde non nisi magno iteratæ conatu egerunt; aut quæ intestinorum moles, si majori vi in herniarum leves temores agit. Quam salubris in hac diathesi foret, ad præcavendas hernias, symptomataque herniæ supervenire solita, Dietetica prophylaxis, intelligit quisquis jartices fonte labra proluit: idque evidenter, si recederet totam gymnasticam ut sanitati conducit, hac hygieinis parte dirigi posse, quæ motum & quietem, ideoque exercitia moderat, hujus præceptis occurritur procatartici causis præcavetur nocuente quæ ab excitationum immoderate exurgere solent: nam unicoque pro conditione & diathesi propriâ, prohibet motus vehementes, saltationes, ponderum gestationem, cantum, rubarum, similibusque inflationem, in aliis morbis non innoxiam; vel saltem imminutionem jubet, quia valde corpus concutitur, vim internecutorum arietantium in annulos adauget, additâ velocitate: præterea calefaciunt, torrent, & exsiccant viscera; constipationemque vel accelerant, vel adaugent. Hygeialicis aliis legibus diætâ obsecratur avertit, alui laxitatem procurat, alimentorum, membranas relaxantium, abusu vetat. Si autem hæc omnia dictis temperentur legibus, causæ omnes supra allatæ, potum aut nihil efficacie habituræ sunt, ad excipiendam herniam; immò in herniosis diætâ præcautiones, vetæ erunt illi remotæ; ipsiusque generationem præpedient: si præsertim fluxilis alvus, excrementorum copia non oneretur. Aliter verò se res habebit, si excrementis scatere, quæ canalum intestinorum oppleant, quò spissiora hæc, sollicitiorave, eo majorem intestinis addent molem: ideoque vim & nifum (momentum autem mechanicum) adaugere valebunt: unde præter malos morbos quos creare solent, ipsas hernias accellerabunt, illasque & exasperare poterunt; ita ut letho proximus superveniat Ileus; hic enim ortum suum ab hac potius causâ, quam ab annulo strictiore repetit: licet enim status in intestino (triangulo contenti, non raro refusionem in abdomen cohibeant; diversa tamen non est strangulationis causa: id enim semper ab alvo nimis adstrictâ procedit. Nisi enim obliquesætarum redimi, fecum solidiorum copiâ, fluiditæ nativâ, facile elaberentur, vel minimâ timâ. Quod verò status ab alvi contractione oriatur, evincunt alvi fiores, quæ tanto pendit desiderio tenentur, statumque ipsi qui tali alvo præditos tanroperè excruciant. In illo enim laxâ & temperatâ, vis generatur status: quos nihil aliud esse comprobatur œolipilæ exemplo, quam ætis portio rarefacta: rarefactio autem a calore, & calor in visceribus, a facum subsistentium quantitate. Sed quod his omnibus coronidem imponit, præstantiores prædicti, ileum herniosum, non aliter aggredi consueverunt, & curare, quam emollientibus, diluentibusque inus & extus adhibitis. Hujus curationis exempla apud Schenxium, Forestum, Hildanumque Chirurgorum sui ævi, Medicus licet, facile principem.

Si hernia situs indicationem non mutat, saltem media immutat, aut variam reddit indicatorum applicationem. Hinc quanti interit herniarum species ab invicem propriis signis discernere, immò hernias ipsas, à cæteris tumoribus, qui ferè semper novitiss imponunt, nonnunquam & expertis; planum est. Probè si hæc distinguenda ab abscessu, hernia illa, quam *ventralis* dicunt. Chirurgos hæc non paucos decepti. Bubonocœle à bubone simplici, venereo, pestilenti, vel recurrente in inguina testiculo; quem verò testium inflammatio pro ophthæce decepti: Chirurgus quidem in tumorum dignotione falli turpe; ac quædam magis medicaminum proficiunt, si non cognita herniâ, alium accuset affectum, remediaque contraria præscribat. Simili pariter errore perit vir optimus, quem melancholici affectione vexatum iactabant Thralesones; dum herniâ crurali confictebatur: hanc cadaveris fœcio ignorantiam prodidit. Sic opinantes, sæpiusque magnates, condignas merito luunt pœnas male collocatæ fiducie: apud quos valent obsequium, & mendacium, Medicina verò ignoratur. Ne te talis error ludat: non semper ex ægri aut altantium relatione de morbo judica. Quotidie enim, tanta est in illis sui ipsius ignorantia, tenebimus aut dyenteria affecti, de diarrhæa conqueruntur: in pectoris morbis, stomachum accusant: & vice versâ in ventriculi affectibus, cor. Ægram itaque partem si fieri potest oculis lustrato, dignitque explorato: atque pyxidibus insitit in herniis, cæteris consentientibus, venturi, timendive Ileii pathognomonium hoc tibi sit signum. Tormina insitit colici doloris, ab eodem loco strangulationis nempe initium fumentia, ibidemque defœnitia; quæ (strangulationem certo denuntiant, quem proximè sequitur illa paffio. Cui Diagonos nota erit, & herniarum, & Ileii prophylaxim facile insitiet; acerbamque hoc symptoma imminens acerbis; alvi scilicet laxitatem procurando, blandis enematis, fætu, balneo, cataplasmatibus emollientibus uno verbo, quidquid intus aut extus emollit, ante, & in ipso illo, adhuc convenit; & alvine feces sunt largo potu diluende. His medendi peritus addet venæ sectiones, & alimentorum delectum, quantitate identem imminuat. Quoties enim in obest Chirurgi cuius reddidit: posteaque intestino reposito, subligacula, Brachia nuncupant, convenientia præscribit: non enim unius formæ esse debent. Scuto adusta pila, aliquo modo cava nonnunquam requiritur: in epiploicæ præsertim, cum aliter Zumbalem herniam appellat Chirurgia patet. Hæc in sinistro latere frequens, quâ non raro calidæ feces, vel tertii dyntia larvâ, miseris simplicisque ludificant juvenales, uxores: ut laxioris inguinis turpidinem dissimulent. Dum iactis ingenti cum ramice nervus. Fasciarum solâ gestatione, unâ cum terum non naturalium medicâ dispensatione, sanari potius consueverunt herniosi, quam alttingentium usu. In eo fasciorum ætas novitas, rem veteribus inauditam, fertum, addere novit: ex quo elateris, in his mirabilem fortuitur effectum: facilius nempe parti accomodatur fasciæ, seu cingula, securiusque & strictius, illarum pilæ, scutave obtutur, & continent. Fasciarum formas & parandi rationem multi exponunt; sed illa ferè omnes duabus figuris eleganter expresse. Aquaspendens una cum aliis instrumentis ferreis, quæ fasciarum vices, in aliis morbis, & ad varios effectus subeunt. Quicumque dolorum atrocitatem, quibus vexantur herniosi, noverit; is facile prophylaxi se subijcet: facilius adhuc à Medico invitabitur, ipsi timens, perpetuandæ mater, & graphicè describit fœviam Chirurgiarum, quibus symptomati funello, à facibus induratis inducto, succurrit. Hæc audâ narratione, quis de prophylaxi follicitis non evadat? Severius hæc excolit Talacoutis, opertum modos ex Paul. Epimerâ, & Ætio refertur: nam igne & ferro, hæc ægritudine curabant veteres, ut notat Severius: sed hujus Chirurgia immanitas exolevit. Evolvere etiam nullis & damnois ligaturæ, ipsaque autæ, vel plumbeæ: punctum vocant deauratum, nec nisi ab importioribus suspensio dignis, propter faciarum ablationem partium, deinceps perficiunt. Jam quidem non mitius, & magis cautè curamus: non hamis, ut docet Celsus, evolendas partes suspendimus: nam dignis minus durè, commodèque magis tractantur, ungulibus leviter læcatur membranarum, solviturque adhesiones, si quæ sunt. Immo ausi sunt absque ligaturâ, & divulsione totum impunè in abdomen refundere; rejectâ etiam (quod est doctrinæ Magati corollarium) turundâ clavatâ, seu capitatâ. Eventus felix, audaciam comprobavit. Attamen non fœvitiâ, nec dolore, immò nec periculo, vacat his temporibus usitata, operis Chirurgici administrandi ratio; petiti expertique etiam inter manus Chirurgi. celeritatem postest operatio ista: Quoties enim tatidus executioni mandata, inutilis evasit: intestino scilicet gangranâ correpto; ut observavi, infirmâ prognos, ex signis, delirio nimirum cæteris symptomatis addito; doloribus itatim & derepente absque manifestâ causâ cessantibus? Hæc qui attento perpenderit animo, si Medicus, totis incumbat viribus prophylaxi; si agrosus, lobens & obsequens, præscriptam à Medico amplectatur diætam. Utetur scilicet alimentis euchymis, eupeptique. Salis, acris, piperata, fumo indurata, aut mutis condita, vitabit. Salsamentorum omne genus, calidæque omnia, vinum meracum, aut ardentes horrebit liquores. Hæstentibus tandem cibis & potu, alvumque lenientibus, vesi non designabitur. Herbas præsertim, quæ inter alimenta locum sibi vindicant, spinaciam, lactucam, betam, fetum licet, fabris non relinquet, aut aliis confimiles. Fructus maturos, refrigerantes, perficis, pruna, poma, & ficus, quæ alvum ducunt, sibi apponi curabit. Nec in deliciis habebit immaturos, & aulteros, quos nisi coctos & ratò degulabit. Largo aque potu assumpta diluet, acerrimis oleo perfusus appetitum citare poterit: ac modo fore lactis, alvum pigram ducere: aut ipsius siquæ ægyptiacæ medullâ, simplici, vel codâ, fœcharove conditâ, vel denique interno oleorum usu. Salphura sulphuris solvi, apud Chymicos audies; hinc in confipatis, si certo alvum ducere volueris, nunquam fine oleo inficiantur adimplent: malique inde ventura bene multa, præcavent. Nam facies in intestinis diutius commorantes, caput tentant, totum corpus excalefaciunt. Si dure, tenebrosi & dyenterici excitant, ileum quoque sæpius, intemæ intestinorum tunicæ adherentes, creant. Quod quidem symptoma herniæ supervenies, si citò occurrit, omni lenientium, emollientium, laxantiumve genere, aut denique ipsâ sectione, lethale evadit. Hæc omnia facili negotio averti possent, si præcautio adhiberetur. Carent enim his malis, quibus alvus est laxa, & dejectio facilis, in illorum intestinis feces moras non trahunt, nec timent symptoma horrendum, ex contraria diathesi orti solitum. Ergo

Alvi laxitas præcaverit Ileum in herniosis.

Proponebat Parisiis ANTONIUS CASAMAJOR, Benearenensis, Baccalaureus Medicus, A. R. S. H. 1721. à sextâ ad meridiem.